

"ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2009 р. N 333
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
 України
 від 16 березня 2017 р. N 180)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК основних лікарських засобів

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами	Форма випуску, доза лікарського засобу
I. Анестетики	
1. Засоби для загальної анестезії та кисень	
Інгаляційні лікарські засоби	
Галотан (Halothane)	рідина для інгаляцій
Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій
Азоту закис (Nitrous oxide)	газ
Кисень (Oxygen)	газ
Ін'єкційні лікарські засоби	
Кетамін (Ketamine)	ін'єкції: 50 мг/мл по 2 мл, по 10 мл
Пропофол (Propofol)	ін'єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл
Тіопентал (Thiopental) (може бути використаний як альтернатива пропофолу)	ін'єкції: 0,5 г; 1 г
2. Місцеві анестетики	
• Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції: 5 мг/мл по 4 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл ін'єкції: 2,5 мг/мл по 20 мл, 200 мл розчин для спінальної анестезії: 0,5 % (гідрохлорид) по 4 мл в ампулах
• Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції: 1 %; 2 % (гідрохлорид) розчин для спінальної анестезії: 5 % (гідрохлорид) по 2 мл в ампулах
Лідокаїн + Епінефрин (Адреналін) (Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline))	стоматологічний картридж (ампула): 2 % (гідрохлорид) + епінефрин 1:80000 ін'єкції: 1 %; 2 % (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин (адреналін) 1:200000 у флаконі
Додатковий перелік	
Ефедрин (Ephedrine)*	ін'єкції: 30 мг (гідрохлорид)/мл по 1 мл в ампулах
3. Передопераційні та седативні засоби для короткочасних процедур	
Атропін (Atropine)	ін'єкції: 1 мг (сульфат) у ампулах по 1 мл

• Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції: 1 мг/мл розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д] таблетки: 7,5 мг; 15 мг
Діазепам (Diazepam) (може бути використаний як альтернатива мідазоламу)	ін'єкції: 5 мг/мл таблетки: 5 мг; 10 мг
Морфін (Morphine)	ін'єкції: 10 мг (сульфат або гідрохлорид) по 1 мл в ампулах
II. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги	
1. Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗ)	
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	супозиторії: 50 мг - 150 мг таблетки: 100 мг - 500 мг
Ібупрофен (Ibuprofen) ☒	розчин або суспензія для перорального застосування: 200 мг/ 5 мл тверді лікарські форми: 200 мг; 400 мг; 600 мг
Парацетамол (Paracetamol)*	розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл супозиторії: 100 мг таблетки: 100 мг - 500 мг розчин для інфузій: 10 мг/мл
2. Опіоїдні анальгетики	
Кодеїн (Codeine)	таблетки: 30 мг (фосфат)
• Морфін (Morphine)	гранули (з повільним вивільненням): 20 мг - 200 мг (морфіну сульфат) ін'єкції: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат) по 1 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5 мл таблетки (пролонгованого вивільнення): 10 мг - 200 мг (морфіну сульфат або гідрохлорид) таблетки: 5 мг; 10 мг (морфіну сульфат)
Гідроморфон (Hydromorphone) (може бути використаний як альтернатива морфіну)	
Оксикодон (Oxycodone) (може бути використаний як альтернатива морфіну)	таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг
3. Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі/Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі	
Амітриптилін (Amitriptiline)	таблетки: 10 мг; 25 мг; 75 мг
Циклізин (Cyclizine) [д]	ін'єкції: 50 мг/мл таблетки: 50 мг
Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах

	(у вигляді динатрієвої фосфатної солі) розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл таблетки: 0,5 мг - 2 мг [д]; 4 мг
Діазепам (Diazepam)	ін'єкції: 5 мг/мл розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг таблетки: 5 мг; 10 мг
Докузат натрію (Docusate sodium)	капсули: 100 мг розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
Флуоксетин (Fluoxetine) ☒	тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду)
Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції: 5 мг по 1 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 2 мг/мл тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 2 мг; 5 мг
Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	ін'єкції: 20 мг/мл
Лактулоза (Lactulose) [д]	розчин/сироп для перорального застосування: 3,1 - 3,7 г/5 мл
Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма: 2 мг
Метоклопрамід (Metoclopramide)	ін'єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл тверда пероральна лікарська форма: 10 мг (гідрохлорид)
Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції: 1 мг/мл; 5 мг/мл розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д] тверда пероральна лікарська форма: 7,5 мг; 15 мг
Ондансетрон (Ondansetron) [д] ☒	ін'єкції: 2 мг/мл по 2 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду) розчин для перорального застосування: 4 мг основи / 5 мл тверда пероральна лікарська форма: 4 мг; 8 мг
Сена (Senna)	рідина для перорального застосування: 7,5 мг/5 мл таблетки: 13,5 мг; 70 мг
III. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії	
Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції: 4 мг/мл по 1 мл та 2 мл в ампулах (у вигляді солі динатрію фосфату)
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі суспензія для ін'єкцій: 25 мг/мл по 2 мл в ампулах таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг

Лоратадин (Loratadine)*	розчин або сироп для перорального застосування: 1 мг/мл; 5 мг/мл таблетки: 10 мг
Преднізолон (Prednisolone)	таблетки: 5 мг; 25 мг розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [д] розчин для ін'єкцій: 30 мг/мл по 1 мл або по 2 мл
IV. Антидоти та інші речовини, що використовуються при отруєннях	
1. Неспецифічні	
Вугілля активоване (Activated charcoal)	порошок: 5 г
2. Специфічні	
Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	ін'єкції: 100 мг/мл по 3 мл; 200 мг/мл по 10 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 10 % [д]; 20 % [д]
Атропін (Atropine)	ін'єкції: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах
Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах
Метилтіонінію хлорид/Метиленовий синій (Methylthioninium chloride/Methylene blue)	ін'єкції: 10 мг/мл по 10 мл в ампулах
Налоксон (Naloxone)	ін'єкції: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах
Пеніциламін (Penicillamine)	тверда пероральна лікарська форма: 250 мг
Калій-заліза гексаціаноферрат (II) (Potassium ferric hexacyano-ferrate (II)-2H ₂ O (Prussian blue))	порошок для перорального застосування
Натрію нітрит (Sodium nitrite)	ін'єкції: 30 мг/мл по 10 мл в ампулах
Натрію тіосульфат (Sodium thiosulphate)	ін'єкції: 250 мг/мл по 50 мл в ампулах
Додатковий перелік	
Дефероксамін (Deferoxamine)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (мезілат) у флаконі
Димеркапрол (Dimercaprol)	розчин для ін'єкцій олійний: 50 мг/мл по 2 мл в ампулах
Натрію, Кальцію едетат (Sodium, Calcium edetate)	ін'єкції: 200 мг/мл по 5 мл в ампулах
Фоменізол (Fomepizole)	ін'єкції: 5 мг/мл (сульфат) по 20 мл в ампулах або 1 г/мл (основа) по 1,5 мл в ампулах
Суцимер (Succimer)	тверда пероральна лікарська форма: 100 мг
V. Протисудомні/протиепілептичні засоби	
Карбамазепін (Carbamazepine)	суспензія для перорального застосування: 100 мг/5 мл таблетки (жувальні, з поділкою): 100 мг; 200 мг
Діазепам (Diazepam)	гель або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0,5 мл; по 2 мл; по 4 мл розчин для ін'єкцій: 5 мг/мл по 2 мл

	таблетки: по 5 мг; 10 мг
Лоразепам (Lorazepam)	парентеральні форми: 2 мг/мл по 1 мл в ампулах; 4 мг/мл по 1 мл в ампулах
Магнію сульфат (Magnesium sulphate)*	ін'єкції: 0,5 г / мл по 2 мл в ампулах (еквівалентно 1 г в 2 мл; 50 % вага/об'єм); 0,5 г / мл по 10 мл в ампулах (еквівалентно 5 г в 10 мл; 50 % вага /об'єм); 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл
Мідазолам (Midazolam)	розчин оромукозний: 5 мг/мл; 10 мг/мл ампула*: 1 мг/мл; 10 мг/мл
Фенобарбітал (Phenobarbital)	ін'єкції: 200 мг/мл (натрій) розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл таблетки: 5 мг - 100 мг
Фенітоїн (Phenytoin)	ін'єкції: 50 мг/мл по 5 мл у флаконах (натрієва сіль) розчин для перорального застосування: 25 мг - 30 мг/5 мл тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг (натрієва сіль) таблетки: 117 мг таблетки (жувальні): 50 мг
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	розчин/сироп для перорального застосування: 57,64 мг/мл по 150 мл; 50 мг/мл по 100 мл; 200 мг/5 мл таблетки (подрібнювані): 100 мг таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 200 мг; 300 мг; 500 мг (вальпроат натрію)
<i>Додатковий перелік</i>	
Етосуксимід (Ethosuximide)	капсули: 250 мг розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	ін'єкції: 100 мг/мл по 4 мл, 5 мл та 10 мл ліофілізат для розчину для ін'єкцій: по 400 мг
VI. Протиінфекційні лікарські засоби	
1. Антигельмінтні лікарські засоби	
Кишкові антигельмінтні лікарські засоби	
Альбендазол (Albendazole)	таблетки: 400 мг
Левамізол (Levamisole)	таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідрохлориду)
Мебендазол (Mebendazole)	таблетки: 100 мг; 500 мг
Ніклозамід (Niklosamide)	таблетки (жувальні): 500 мг
Празиквантел (Praziquantel)	таблетки: 150 мг; 600 мг
Пірантел (Pirantel)	розчин/суспензія пероральна: 50 мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл таблетки: 250 мг (у вигляді ембонату або памоату)

Протималярійні лікарські засоби	
Альбендазол (Albendazole)	таблетки: 400 мг
Диетилкарбамазепін (Diethylcarbamazine)	таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат)
Івермектин (Ivermectin)	таблетки (з поділкою): 3 мг
Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби	
Празиквантел (Praziquantel)	таблетки: 600 мг
Триклабендазол (Triclabendazole)	таблетки: 250 мг
Додатковий перелік	
Оксамніхін (Oxamniquine)*	капсули: 250 мг розчин пероральний: 250 мг/5 мл
2. Антибактеріальні лікарські засоби	
Бета-лактамі антибіотики	
Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату) порошок для приготування розчину / суспензії для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл або 250 мг/5 мл [д]
Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31,25 мг клавуланової кислоти/5 мл порошок для оральної суспензії: 250 мг амоксициліну + 62,5 мг клавуланової кислоти/5 мл [д] таблетки: 250 мг/62,5 мг; 500 мг/125 мг
Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі)
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin)	порошок для приготування суспензії для ін'єкцій: 900 мг бензилпеніциліну (= 1,2 млн. МО) по 5 мл у флаконі [д]; 1,44 г бензилпеніциліну (= 2,4 млн. МО) по 5 мл у флаконі
Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 600 мг (= 1 млн. МО), (натрієвої або калієвої солі); 3 г (= 5 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі)
Цефалексин (Cefalexin) [д]	порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний); 125 мг/5 мл капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату)
Цефазолін (Cefazolin)* ☒	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі
Цефіксим (Cefixime)*	капсули: 400 мг (у вигляді тригідрату)
Цефтріаксон (Ceftriaxone)* ☒	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі

Клоксацилін (Cloxacillin)	капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл
Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin)	порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі)
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)*	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (= 1 млн. МО); 3 г (= 3 млн. МО) у флаконі
<i>Додатковий перелік</i>	
Цефотаксим (Cefotaxime)* [сн]	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг у флаконі (у вигляді натрієвої солі)
Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі
Іміпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)*	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі); 500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах
Інші антибактеріальні лікарські засоби	
Азитроміцин (Azithromycin)*	тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг порошок для приготування оральної суспензії: 200 мг/5 мл розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл
Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма: 250 мг олійна суспензія для ін'єкцій*: 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (натрію сукцинат) у флаконі
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)*	розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [д] розчин для внутрішньовенних інфузій: 2 мг/мл (у вигляді гіклату) [д] таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)
Кларитроміцин (Clarithromycin)*	тверда пероральна лікарська форма: 500 мг
Доксициклін (Doxycycline) ☒	розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл (безводний) [д] розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл [д] (у вигляді хіклату) тверда пероральна лікарська форма: 50 мг [д]; 100 мг

Гентаміцин (Gentamicin)	ін'єкції: 10 мг (у вигляді сульфату)/мл по 2 мл в ампулах; 40 мг (у вигляді сульфату)/мл по 2 мл в ампулах
Еритроміцин (Erythromycin)	тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 250 мг порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату)
Метронідазол (Metronidazole)	ін'єкції: 500 мг по 100 мл у флаконі супозиторії, таблетки вагінальні, песарії: 500 мг; 1 г таблетки: 200 мг - 500 мг розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл
Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)	тверда пероральна лікарська форма: 100 мг розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]
Спектиноміцин (Spectinomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі
Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг; 800 мг + 160 мг ін'єкції: 80 мг + 16 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах концентрат для приготування розчину для інфузій: (80 мг + 16 мг)/мл
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Кліндаміцин (Clindamycin)</i>	<i>капсули: 150 мг (у вигляді гідрохлориду) ін'єкції: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [сп]</i>
<i>Ванкоміцин (Vancomycin)</i>	<i>порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 500 мг; 1000 мг (гідрохлорид) у флаконі ліофілізат для приготування розчину для інфузій: 500 мг; 1000 мг у флаконі</i>
Антилепрозійні лікарські засоби	
Клофазимін (Clofazimine)	капсули: 50 мг; 100 мг
Дапсон (Dapsone)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мг
Протитуберкульозні лікарські засоби	
Етамбутол (Ethambutol)	ін'єкції: 100 мг/мл

	таблетки: 100 мг - 400 мг (гідрохлорид) розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [д]
Етамбутол + Ізоніазид (Ethambutol + Isoniazid)	таблетки: 400 мг + 150 мг
Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг
Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	таблетки: 275 мг + 75 мг + 150 мг
Ізоніазид (Isoniazid)	ін'єкції: 100 мг/мл по 5 мл в ампулах таблетки: 100 мг - 300 мг розчин / сироп для перорального застосування: 100 мг/5 мл розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д] таблетки (з поділкою): 50 мг
Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень); 75 мг + 50 мг + 150 мг; 60 мг + 30 мг + 150 мг
Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки: 75 мг + 150 мг таблетки: 150 мг + 300 мг; 60 мг + 60 мг/150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень); 75 мг + 50 мг; 60 мг + 30 мг
Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки: 400 мг; 500 мг розчин для перорального застосування: 30 мг/мл [д] таблетки (дисперговані): 150 мг таблетки (з поділкою): 150 мг
Рифабутин (Rifabutin)*	капсули: 150 мг
Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мг розчин для перорального застосування: 20 мг/мл [д]
Рифапентин (Rifapentine)*	таблетки: 150 мг
Стрептоміцин (Streptomycin) [сп]	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у флаконі
<i>Додатковий перелік</i>	
Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг; 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату) розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл по 2 мл
Капреоміцин (Capreomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату)
Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма: 250 мг
Теризидон (Terizidone)	капсули: 250 мг; 300 мг

(може бути використаний як альтернатива циклосерину)	
Деламанід (Delamanid)	таблетки: 50 мг
Етіонамід (Ethionamide)	таблетки: 125 мг; 250 мг
Протіонамід (Protionamide) (може бути використаний в як альтернатива етіонаміду)	таблетки: 250 мг
Канаміцин (Kanamycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) розчин
Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції: 5 мг/мл таблетки: 250 мг; 500 мг; 750 мг
Офлоксацин (Ofloxacin) (може бути використаний в як альтернатива левофлоксацину)	ін'єкції: 2 мг/мл або 200 мг/100 мл таблетки: 200 мг; 400 мг
Моксифлоксацин (Moxifloxacin) (може бути використаний в як альтернатива левофлоксацину)	ін'єкції: 400 мг/100 мл; 400 мг/250 мл таблетки: 400 мг
Лінезолід (Linezolid)	розчин для інфузій: 2 мг/мл по 300 мл у пляшках таблетки: 400 мг; 600 мг порошок для приготування розчину для перорального застосування: 100 мг/5 мл
Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)	ін'єкції: 30 мг/мл гранули: 4 г у пакетику гранули кишковорозчинні: 600 мг/г по 9,2 г гранул в саше порошок для орального розчину: по 5,52 г в саше таблетки: 500 мг

3. Протигрибкові лікарські засоби

Амфотерицин В (Amphotericin B)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (у вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами)
Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальний крем: 1 %; 10 % вагінальні таблетки: 100 мг; 200 мг; 500 мг
Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма: 50 мг ін'єкції: 2 мг/мл у флаконі розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
Флукитозин (Flucytosine)	розчин для інфузій: 2,5 г / 250 мл капсули: 250 мг
Гризеофульвін (Griseofulvin)	тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д]
Ністатин (Nystatin)	таблетки: 100000 МО; 500000 МО пастилки: 100000 МО розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл

	[д]; 100000 МО/мл [д] песарії: 100000 МО
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Калію йодид (Potassium iodide)</i>	<i>насичений розчин</i>
4. Протівірусні лікарські засоби	
Протигерпесні лікарські засоби	
Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі таблетки: 200 мг; 400 мг розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [д]
Антиретровірусні лікарські засоби	
Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази	
Абакавір (Abacavir)	розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату)/5 мл або 20 мг/мл таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату)
Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл або 10 мг/мл таблетки: 150 мг
Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)	таблетки (тенофовіру дизопроксилу фумарат - еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг
Зидовудин (Zidovudine)	розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл або 10 мг/мл розчин для приготування внутрішньовенних інфузій: 10 мг/мл у 20 мл таблетки: 300 мг капсули: 100 мг; 250 мг
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази	
Ефавіренз (Efavirenz) ☒	капсули: 50 мг; 100 мг; 200 мг таблетки: 200 мг; 600 мг
Невірапін (Nevirapine)	рідина для перорального застосування: 50 мг/5 мл таблетки: 50 мг; 200 мг
Інгібітори протеази	
Атазанавір (Atazanavir) ☒	тверда пероральна лікарська форма: 100 мг; 150 мг; 300 мг (у вигляді сульфату)
Ритонавір (Ritonavir)	таблетки (термостабільні): 25 мг; 100 мг капсули: 100 мг розчин для перорального застосування: 400 мг/5 мл
Саквінавір (Saquinavir)* ☒	тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату)
Фіксовані комбінації	

Абакавір + Ламівудін (Abacavir + Lamivudine)	таблетки: 60 мг (як сульфат) + 30 мг; 600 мг + 300 мг
Ефавіренз + Емтрицитабін + Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)
Емтрицитабін + Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки: 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)
Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки: 30 мг + 60 мг [д]; 150 мг + 300 мг
Інші протівірусні засоби	
Озельтамівір (Oseltamivir)*	капсули: 30 мг; 45 мг; 75 мг (фосфату) порошок для приготування суспензії для перорального застосування: 12 мг/мл; 6 мг/мл
Рибавірин (Ribavirin)*	тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 400 мг; 600 мг ін'єкція для внутрішньовенного введення: 800 мг і 1 г в 10 мл розчину фосфатного буфера
Лікарські засоби проти гепатиту	
Лікарські засоби для лікування гепатиту В	
Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази	
Ентекавір (Entecavir)	розчин для перорального застосування: 0,05 мг/мл таблетки: 0,5 мг; 1 мг
Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate (TDF))	таблетки: 300 мг (тенофовіру дизопроксилу фумарат, що еквівалентно 245 мг тенофовіру дизопроксилу)
Лікарські засоби для лікування гепатиту С	
Нуклеотидні інгібітори полімерази	
Софосбувір (Sofosbuvir)	таблетки: 400 мг
Інші протівірусні засоби	
Рибавірин (Ribavirin)*	розчин для внутрішньовенного введення: 1 г / 10 мл фосфатного буферного розчину таблетки/капсули: 200 мг; 400 мг; 600 мг розчин для внутрішньовенного введення: 800 мг/10 мл фосфатного буферного розчину
Додатковий перелік	
Пегільований інтерферон альфа (2а або 2b) (Pegylated interferon alpha (2a or 2b))*	флакон або шприц: 80 мкг; 100 мкг; 120 мкг (пегільований інтерферон альфа 2b); 90 мкг, 180 мкг (пегільований інтерферон альфа 2a)
5. Засоби для лікування протозойних інфекцій	
Засоби для лікування амебіази та лямбліозу	
Дилоксанід (Diloxanide) ☒	таблетки: 500 мг (фураат)
Метронідазол (Metronidazole)	ін'єкції: 500 мг в 100 мл флаконах таблетки: 200 мг - 500 мг

	розчин оральний: 200 мг (бензоат)/5 мл
Засоби для лікування лейшманіозу	
Амфотерицин В (Amphotericin B)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій: 50 мг у флаконі (як дезоксіхолатов натрію або ліпосомного комплексу)
Мілтефозін (Miltefosine)	тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 50 мг
Паромоміцин (Paromomycin)	розчин для ін'єкцій: 750 мг паромоміцину (у вигляді сульфату)
Натрію стибоглюконат або Меглюмін антимоіат (Sodium stibogluconate or Meglumine antimoniate)	ін'єкції: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл або 30 %, що еквівалентно приблизно 8,1 % сурмі (п'ятивалентній) по 5 мл в ампулах
Засоби для лікування малярії	
Для лікування малярії	
Амодіахін (Amodiaquine)*	таблетки: 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду)
Артеметер (Artemether)*	розчин олійний: 80 мг/мл в ампулах по 1 мл
Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)*	таблетки: 20 мг + 120 мг таблетки (дисперговані): 20 мг + 120 мг [д]
Артезунат (Artesunate)*	ін'єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артезунатової кислоти з окремою ампулою 5 % розчину натрію бікарбонату ректальна лікарська форма: 50 мг; 200 мг [д] таблетки: 50 мг
Артезунат + Амодіахін (Artesunate + Amodiaquine)*	таблетки: 25 мг + 67,5 мг; 50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг
Артезунат + Мефлохін (Artesunate + Mefloquine)	таблетки: 25 мг + 55 мг; 100 мг + 220 мг
Хлорохін (Chloroquine)*	розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл таблетки: 100 мг; 150 мг; 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату)
Доксициклін (Doxycycline)*	таблетки: 100 мг таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату) капсули: 100 мг
Мефлохін (Mefloquine)*	таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)
Прімахін (Primaquine)*	таблетки: 7,5 мг; 15 мг (у вигляді дифосфату)
Хінін (Quinine)*	ін'єкції: 300 мг хініну гідрохлориду/мл по 2 мл в ампулах таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату
Сульфадоксин + Піриметамін (Sulfadoxine + Pyrimethamine)*	таблетки: 500 мг + 25 мг
Для профілактики малярії	
Хлорохін (Chloroquine)*	розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або

	сульфату)/5 мл таблетки: 150 мг; 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату)
Доксициклін (Doxycycline) ☒	тверда пероральна лікарська форма: 100 мг (у вигляді гідрохлориду або хіклату)
Мефлохін (Mefloquine) ☒	таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)
Прогуаніл (Proguanil)*	таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду)
Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу	
Піриметамін (Pyrimethamine)	таблетки: 25 мг
Сульфадіазин (Sulfadiazine)	таблетки: 500 мг
Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	ін'єкції: 80 мг + 16 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах рідинка для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл [д] таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг [д]
Додатковий перелік	
Пентамідин (Pentamidine)	таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізоміонату)
VII. Лікарські засоби для лікування мігрені	
1. Для лікування гострого нападу мігрені	
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки: 300 мг - 500 мг
Ібупрофен (Ibuprofen) [д]	таблетки: 200 мг; 400 мг
Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл; 120 мг/ 5 мл [д] тверда пероральна лікарська форма: 200 мг - 500 мг
2. Для профілактики мігрені	
Пропранолол (Propranolol)	таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг (гідрохлорид)
VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби	
1. Імуносупресивні лікарські засоби	
Додатковий перелік	
Азатіоприн (Azathioprine)	порошок для розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі таблетки: 50 мг
Циклоспорин (Ciclosporin)	капсули: 25 мг концентрат для розчину для ін'єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах для трансплантації органів
2. Цитотоксичні та ад'ювантні лікарські засоби	
Додатковий перелік	
Повністю трансретіноєва кислота (All-trans retinoid acid (ATRA)) Третіноїн (Tretinoin)	капсули: 10 мг
Алопуринол (Allopurinol) [сн]	таблетки: 100 мг; 300 мг

Бендамустин (Bendamustine)*	ін'єкції: 45 мг/0,5 мл; 180 мг/2 мл; 2,5 мг/мл по 25 мг у флаконі; 2,5 мг/мл по 100 мг у флаконі
Блеоміцин (Bleomycin)*	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 15 мг чи 15 МО (у вигляді сульфату) у флаконі
Кальцію фолінат (Calcium folinate)*	ін'єкції: 3 мг/мл по 10 мл; 10 мг/мл по 3 мл таблетки: 15 мг
Капецитабін (Capecitabine)*	таблетки: 150 мг; 500 мг
Карбоплатин (Carboplatin)*	ін'єкції: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл
Хлорамбуцил (Chlorambucil)*	таблетки: 2 мг
Цисплатин (Cisplatin)*	ін'єкції: 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл
Циклофосфамід (Cyclophosphamide)*	порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконі таблетки: 25 мг
Цитарабін (Cytarabine)*	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 100 мг у флаконі
Дакарбазин (Dacarbazine)*	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій: 100 мг у флаконі; 200 мг у флаконі; 500 мг у флаконі
Дактиноміцин (Dactinomycin)*	порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мкг у флаконах
Даунорубіцин (Daunorubicin)*	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконі; по 20 мг у флаконі
Доцетаксел (Docetaxel)*	ін'єкції: 20 мг/мл; 40 мг/мл
Доксорубіцин (Doxorubicin)*	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій: 10 мг у флаконах; 50 мг у флаконах
Етопозид (Etoposide)*	капсули: 100 мг ін'єкції: 20 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах)
Флударабін (Fludarabine)*	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій: 50 мг (фосфат) у флаконі таблетки: 10 мг
Фторурацил (Fluorouracil)*	ін'єкції: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах)
Філграстим (Filgrastim)*	ін'єкції: 120 мкг/0,2 мл; 300 мкг/0,5 мл; 480 мкг/0,8 мл; 480 мкг/0,5 мл у попередньо заповнених шприцах (шприц-дозах); 300 мкг/мл по 1 мл; 480 мг/1,6 мл по 1,6 мл у флаконі
Гемцитабін (Gemcitabine)*	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій: 200 мг; 1 г у флаконі
Іфосфамід (Ifosfamide)*	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 500 мг; 1 г; 2 г у флаконі
Іматиніб (Imatinib)*	таблетки: 100 мг; 400 мг
Іринотекан (Irinotecan)*	ін'єкції: 40 мг/2 мл по 2 мл; 100 мг/5 мл по 5 мл; 500 мг/25 мл по 25 мл у

	флакони
Меркаптопурин (Mercaptopurine)*	таблетки: 50 мг
Метотрексат (Methotrexate)*	таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі/чи еквівалент метотрексату безводного) ін'єкції: 25 мг/мл (50 мг у флаконі); 100 мг/1 мл
Оксаліплатин (Oxaliplatin)*	ін'єкції: 50 мг/10 мл по 10 мл; 100 мг/20 мл по 20 мл; 200 мг/40 мл по 40 мл у флаконі порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 50 мг; 100 мг у флаконі
Паклітаксел (Paclitaxel)*	порошок для розчину для ін'єкцій: 6 мг/мл концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/мл
Прокарбазин (Procarbazine)	капсули: 50 мг (у вигляді гідрохлориду)
Ритуксимаб (Rituximab)*	ін'єкції: 100 мг/10 мл по 10 мл; 500 мг/50 мл по 50 мл у флаконі
Вінбластин (Vinblastine)*	порошок для розчину для ін'єкцій: 10 мг (сульфат) у флаконі
Вінкристин (Vincristine)*	порошок для розчину для ін'єкцій: 1 мг (сульфат); 5 мг (сульфат) у флаконі розчин для ін'єкцій: 1 мг (сульфат); 5 мг (сульфат) у флаконі
Вінорелбін (Vinorelbine)*	ін'єкції: 10 мг/мл по 1 мл; 50 мг/5 мл по 5 мл у флаконі
3. Гормони та антигормони	
Додатковий перелік	
Анастрозол (Anastrozole)*	таблетки: 1 мг
Бікалутамід (Bicalutamide)*	таблетки: 50 мг
Дексаметазон (Dexamethasone)*	ін'єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату) розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл [сн]
Гідрокортизон (Hydrocortisone)*	порошок для розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрію суццинату) у флаконі
Метилпреднізолон (Methylprednisolone)* [сн]	ін'єкції: 40 мг/мл (у вигляді натрію суццинату) по 1 мл у одноклизових флаконах та по 5 мл у багатодозових флаконах; 80 мг/мл (у вигляді натрію суццинату) по 1 мл у одноклизових флаконах; 125 мг (у вигляді натрію суццинату) у флаконі; 250 мг (у вигляді натрію суццинату) у флаконі; 500 мг (у вигляді натрію суццинату) у флаконі; 1000 мг (у вигляді натрію суццинату) у флаконі
Преднізолон (Prednisolone)*	розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [сн] таблетки: 5 мг; 25 мг розчин для ін'єкцій: 30 мг/мл в ампулах

Тамоксифен (Tamoxifen)*	таблетки: 10 мг; 20 мг
IX. Протипаркінсонічні лікарські засоби	
Біпериден (Biperiden)	ін'єкції: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах таблетки: 2 мг (гідрохлорид)
Леводопа + Карбидопа (Levodopa + Carbidopa)	таблетки: 100 мг + 10 мг; 100 мг + 25 мг; 250 мг + 25 мг
X. Лікарські засоби, що впливають на кров	
1. Антианемічні лікарські засоби	
Заліза сіль (Ferrous salt)	розчин для перорального застосування: еквівалентно 8 мг - 25 мг заліза (у вигляді сульфату)/мл таблетки: еквівалентно 60 мг - 80 мг заліза
Заліза сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)*	таблетки: еквівалентно 60 мг - 100 мг заліза + 350 мкг - 400 мкг фолієвої кислоти
Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки: 400 мкг*; 1 мг; 5 мг
Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin) / Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	ін'єкції: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах ін'єкції: 0,2 мг/мл та 0,5 мг/мл в ампулах
2. Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію	
Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції: 20 мг/0,2 мл; 40 мг/0,4 мл; 60 мг/0,6 мл; 80 мг/0,8 мл; 100 мг/1 мл; 120 мг/0,8 мл; 150 мг/1 мл в ампулах або шприц-дозах
Надропарин (Nadroparin) (може бути використаний як альтернатива еноксапарину)	ін'єкції: 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл; по 0,4 мл; по 0,6 мл; по 0,8 мл у попередньо наповнених шприцах; 9500 МО анти-Ха/мл по 5 мл у флаконі
Далтепарин (Dalteparin) (може бути використаний як альтернатива еноксапарину)	ін'єкції: 2500 МО чи 5000 МО (анти-Ха)/0,2 мл по 0,2 мл в одноразових шприцах; 10000 МО (анти-Ха)/мл по 1 мл в ампулах
Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: 1000 МО/мл; 5000 МО/мл; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах
Фітоменадіон (Phytomenadione)	таблетки: 10 мг ін'єкції: 1 мг/мл по 5 мл в ампулах [д]; 10 мг/мл по 5 мл в ампулах; 10 мг/мл по 1 мл
Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	ін'єкції: 10 мг/мл по 5 мл в ампулах; 1000 МО (10 мг)/мл по 5 мл у флаконі (у вигляді гідрохлориду)
Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції: 100 мг/мл по 5 мл або 10 мл в ампулах таблетки: 250 мг - 650 мг
Варфарин (Warfarin)	таблетки: 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 2,5 мг; 3 мг; 5 мг
Додатковий перелік [сн]	
Десмонпресин (Desmopressin)	ін'єкції: 4 мкг/мл (ацетат) по 1 мл; 15 мкг/мл по 1 мл в ампулах
3. Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях	

<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Дефероксамін (Deferoxamine)</i>	<i>порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконі</i>
<i>Деферасірокс (Deferasirox)</i> (може бути використаний як альтернатива дефероксаміну)	<i>таблетки (дисперговані): 250 мг; 500 мг</i>
<i>Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)</i>	<i>тверда пероральна дозована форма: 200 мг; 500 мг; 1 г</i>
XI. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження	
1. Кров і компоненти крові	
Свіжозаморожена плазма (Fresh-frozen plasma)	
Тромбоцити (Platelets)	
Червоні кров'яні тілця (Red blood cells)	
2. Препарати на основі (похідні) плазми крові	
Імуноглобуліни людини (Human immunoglobulins)	
Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції: 250 мкг разова доза у флаконах; 125 мкг/1 мл; 300 мкг/1 мл; 300 мкг/2 мл
Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin)	ін'єкції: 150 МО/мл у флаконах; 150 МО/мл у ампулах
Протиправцевий імуноглобулін (Anti-tetanus immunoglobulin)	ін'єкції: 500 МО у флаконах; 250 МО/5 мл (1 доза) в ампулах
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)</i>	<i>внутрішньом'язове введення: 16 % розчин протеїну* внутрішньовенне введення: 5 %; 10 % розчин протеїну** підшкірне введення: 15 %; 16 % розчин протеїну*</i>
Фактори згортання крові	
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Фактор згортання крові VIII (Coagulation factor VIII)</i>	<i>порошок для розчину для ін'єкцій: 250 МО; 500 МО; 1000 МО у флаконі</i>
<i>Фактор згортання крові IX (Coagulation factor IX)</i>	<i>порошок для розчину для ін'єкцій: 500 МО; 600 МО; 1000 МО у флаконі</i>
3. Плазмозамінники	
Декстран 70 (Dextran 70)	розчин для ін'єкцій: 6 %
Декстран 1 (Dextran 1) (може бути використаний в якості альтернативи декстрану 70)	
Декстран 40 (Dextran 40) (може бути використаний в якості альтернативи декстрану 70)	ін'єкції: 100 мг/1 мл

XII. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи

1. Антиангінальні лікарські засоби

Бісопролол (Bisoprolol)	таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Метопролол (Metoprolol)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
Карведіол (Carvedilol)	таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	таблетки: (сублінгвальні) 500 мкг
Ізосорбід динітрат (Isosorbide dinitrate)	таблетки: (сублінгвальні) 5 мг
Верапаміл (Verapamil)	таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид)

2. Антиаритмічні лікарські засоби

Бісопролол (Bisoprolol)	таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Метопролол (Metoprolol)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
Карведіол (Carvedilol)	таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Дигоксин (Digoxin)	ін'єкції: 250 мкг/мл по 2 мл; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 50 мкг/мл таблетки: 62,5 мкг; 250 мкг
Епінефрин (Epinephrine)	ін'єкції: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах; 1,82 мг/мл по 1 мл в ампулах
Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 5 мл; 100 мг/мл по 2 мл в ампулах
Верапаміл (Verapamil)	ін'єкції: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид)

Додатковий перелік

<i>Аміодарон (Amiodarone)</i>	<i>ін'єкції: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид) таблетки: 100 мг; 200 мг; 400 мг (гідрохлорид)</i>
-------------------------------	--

3. Антигіпертензивні лікарські засоби

Амлодипін (Amlodipine)	таблетки: 5 мг; 10 мг (у вигляді малеату, месилату або бесилату)
Бісопролол (Bisoprolol)	таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Атенолол (Atenolol)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
Метопролол (Metoprolol)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
Карведіол (Carvedilol)	таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Еналаприл (Enalapril)	тверда пероральна лікарська форма: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеату водню)

Гідралазин (Hydralazine)*	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид)
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл тверда пероральна лікарська форма: 12,5 мг; 25 мг
Метилдопа (Methyldopa)*	таблетки: 250 мг
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Нітронпрусид натрію (Sodium nitroprusside)</i>	<i>порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 50 мг в ампулах</i>
4. Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності	
Бісопролол (Bisoprolol)	таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
Метопролол (Metoprolol)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг
Карведіол (Carvedilol)	таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Дигоксин (Digoxin)	ін'єкції: 250 мкг/мл по 2 мл; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 50 мкг/мл таблетки: 62,5 мкг; 250 мкг
Еналаприл (Enalapril)	тверда пероральна лікарська форма: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеату водню)
Фуросемід (Furosemide)	ін'єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 20 мг/5 мл [д] таблетки: 40 мг
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл тверда пероральна лікарська форма: 25 мг
Спіронолактон (Spironolactone)	таблетки: 25 мг
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Допамін (Dopamine)</i>	<i>ін'єкції: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл в ампулах</i>
5. Антитромботичні лікарські засоби	
Антиагреганти	
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	тверда пероральна лікарська форма: 75 мг - 300 мг
Клопідогрел (Clopidogrel)	таблетки: 75 мг; 300 мг
Тромболітичні лікарські засоби	
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Стрептокіназа (Streptokinase)</i>	<i>порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1,5 млн. МО у флаконі</i>
6. Гіполіпідемічні лікарські засоби	
Симвастатин (Simvastatin)*	таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг

XIII. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)

1. Протигрибкові лікарські засоби

Міконазол (Miconazole)	крем або мазь: 2 % (нітрат)
Сульфід селену (Selenium sulfide)	суспензія на основі миючого засобу: 2 %
Гіпосульфит (Sodium thiosulfate)	розчин: 15 %
Тербінафін (Terbinafine)	крем: 1 % мазь: 1 % тербінафін гідрохлорид

2. Антибактеріальні лікарські засоби

Мупіроцин (Mupirocin)	крем: 2 % (у вигляді мупіроцину кальцію) мазь: 2 %
Перманганат калію (Potassium permanganate)	водний розчин: 1:10000 порошок: по 3 г або 5 г
Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine) ☒	крем: 1 %

3. Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби

Бетаметазон (Betamethasone) ☒	крем або мазь: 0,1 % (у вигляді валерату)
Каламін (Calamine)	лосьйон
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь: 1 % (ацетат)

4. Лікарські засоби, що впливають на процеси видозмінення шкіри

Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide)	крем, мазь, лосьйон: 5 %; 10 %
Фторурацил (Fluorouracil)	мазь: 5 %
Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування: 1 %; 5 % по 25 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл
Сечовина (Urea)	крем або мазь: 5 %; 10 %

5. Лікарські засоби для лікування педикульозу

Бензилбензоат (Benzyl benzoate) ☒	лосьйон: 25 % емульсія на шкірну: 200 мг/г по 50 г або 100 г у флаконі мазь: 200 - 250 мг/г
Перметрин (Permethrin)	крем: 5 % лосьйон: 1 % мазь: 40 мг/г розчин на шкірний: 0,5 % по 50 г у флаконі

XIV. Лікарські засоби для діагностики

1. Офтальмологічні лікарські засоби

Флуоресцеїн (Fluorescein)	очні краплі: 1 % (натрієва сіль) розчин для ін'єкцій: 10 % по 5 мл у флаконі для діагностичної ангіографії
Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі: 0,5 %; 1 %

2. Рентгеноконтрастні лікарські засоби

Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції: 140 мг - 420 мг йоду/мл в 5 мл; 10 мл;
------------------------------	--

	20 мл в ампулах
Барію сульфат (Barium sulfate)	водний розчин порошок для приготування суспензії: 80 г
Йогексол (Iohexol)	ін'єкції: 140 мг - 350 мг йоду/мл в 5 мл; 10 мл; 20 мл; 50 мл; 100 мл
<i>Додатковий перелік</i>	
Меглуміну йотроксат (Meglumine iotroxate)	розчин: 5 г - 8 г йоду в 100 мл до 250 мл
XV. Дезінфектори і антисептики	
1. Антисептики	
Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин: 5 % (біглюконат) гель: 4 %
Етанол (Ethanol)	розчин: 70 % (денатурований)
Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин: 10 % (еквівалентно 1 % активного йоду)
2. Дезінфектори	
Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)	розчин, що містить етанол в розмірі 80 % / об'єм розчин, що містить ізопропіловий спирт в розмірі 75 % /об'єм
Суміш на основі хлору (Chlorine base compound)	порошок: (0,1 % активного хлору) для розчину
Хлороксиленол (Chloroxylenol)	розчин: 4,8 %
Глутарал (Glutaral)	розчин: 2 %
XVI. Діуретики	
Амilorид (Amiloride)	таблетки: 5 мг (гідрохлорид)
Фуросемід (Furosemide)	ін'єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 20 мг/5 мл [д] таблетки: 10 мг [д]; 20 мг [д]; 40 мг
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	тверда пероральна лікарська форма: 25 мг
Маніт (Mannitol)	розчин для ін'єкцій: 10 %; 20 % розчин для інфузій: 15 % по 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках; по 100 мл, 250 мл, 500 мл у контейнерах
Спіронолактон (Spironolactone)	таблетки: 25 мг
<i>Додатковий перелік</i>	
Спіронолактон (Spironolactone)	розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25 мг/5 мл
XVII. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту	
<i>Додатковий перелік [сн]</i>	
Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	лікарські засоби та дози, включаючи ліпази, протеази та амілази, застосовувати відповідно до віку

1. Противиразкові лікарські засоби		
Додатковий перелік		
Оменпразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 40 мг в ампулах порошок для приготування розчину для перорального застосування: 20 мг; 40 мг у саше тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 20 мг; 40 мг	
Ранітидин (Ranitidine)	ін'єкції: 25 мг/мл (у вигляді гідрохлориду) по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (у вигляді гідрохлориду) таблетки: 150 мг (у вигляді гідрохлориду)	
2. Антиеметики		
Додатковий перелік		
Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді динатрієвої солі фосфату) розчин для перорального застосування: 0,5 мг/5 мл; 2 мг/5 мл тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг	
Метоклопрамід (Metoclopramide) ☒	ін'єкції: 5 мг (гідрохлорид) / мл по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл [d] таблетки: 10 мг (гідрохлорид)	
Ондансетрон (Ondansetron) ☒	ін'єкції: 2 мг основа/мл по 2 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду) розчин для перорального застосування: 4 мг основа / 5 мл тверда пероральна лікарська форма: відповідає 4 мг основи; 8 мг основи; 24 мг основи	
3. Протизапальні лікарські засоби		
Сульфасалазин (Sulfasalazine)	утримувальна клізма свічка: 500 мг таблетки: 500 мг	
Додатковий перелік		
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	утримувальна клізма свічка: 25 мг (ацетат)	
4. Проносні лікарські засоби		
Сена (Senna)	таблетки: 7,5 мг; 13,5 мг; 70 мг (сеннозиди)	
5. Лікарські засоби, що застосовуються при діарейі		
Пероральна регідрація		
Солі для пероральної регідрації (Oral rehydration salts)	порошок для розведення в 200 мл; 500 мл; 1 л	
	Глюкоза:	75 міліеквівалент (млек)
	Натрій:	75 млек чи ммоль/л

	Хлорид:	65 млек чи ммоль/л
	Калій:	20 млек чи ммоль/л
	Цитрат:	10 ммоль/л
	Осмолярність:	245 мосм/л
	Глюкоза:	13,5 г/л
	Натрію хлорид:	2,6 г/л
	Калію хлорид:	1,5 г/л
	Тринатрію цитрат дигідрат:	2,9 г/л
	бікарбонат натрію може замінювати тринатрію цитрат дигідрат	2,5 г/л
	порошок для орального розчину: по 4,4 г у пакетах N 5 або N 20 (1 пакетик містить глюкози безводної 2,7 г, натрію цитрату 0,58 г, натрію хлориду 0,52 г, калію хлориду 0,3 г) порошок для орального розчину: по 10,7 г у пакетах N 20 (1 пакетик містить 0,75 г калію хлориду, 1,3 г натрію хлориду, 1,45 г натрію цитрату, 6,75 г глюкози безводної)	
Лікарські засоби від діареї		
Сульфат цинку (Zinc sulfate)*	тверда пероральна лікарська форма: 20 мг	
XVIII. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях		
1. Кортикостероїди і синтетичні замінники		
Флудрокортизон (Fludrocortisone)	таблетки: 100 мкг (ацетат)	
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг порошок для розчину для ін'єкцій: по 100 мг у флаконах	
2. Андрогени		
Додатковий перелік		
Тестостерон (Testosterone)	ін'єкції: 200 мг (енантат) по 1 мл в ампулах; 250 мг/мл по 1 мл, 4 мл в ампулах	
3. Контрацептиви*		
Оральні гормональні контрацептиви		
• Етинілестріадіол (Ethinylestradiol) + • Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки: 30 мкг + 150 мкг	
• Етинілестріадіол (Ethinylestradiol) + • Норетистерон (Norethisterone)	таблетки: 35 мкг + 1 мг	
Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки: 30 мкг; 750 мкг (пакет із двох); 1.5 мг	
Ін'єкційні гормональні контрацептиви		

Естрадіол ципіонат (Estradiol cypionate) + Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	ін'єкція: 5 мг + 25 мг
Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	депо ін'єкції: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі
Норетистерону енантат (Norethisterone enantate)	масляний розчин: 200 мг/мл по 1 мл в ампулах
Імплантабельні контрацептиви	
Етоногестрел-релізінговий імплантат (Etonogestrel-releasing implant)	одностержневий етоногестрело-релізінговий імплантат, який містить 68 мг етоногестрела
Левоноргестрел-релізінговий імплантат (Levonorgestrel-releasing implant)	два стрижня левоноргестрело-релізінгового імплантата, кожен стрижень якого містить 75 мг левоноргестрелу (150 мг від загального обсягу)
Внутрішньоматкові засоби	
Левоноргестрел-релізінг внутрішньоматкової системи (levonorgestrel-releasing intrauterine system)	внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу
Інтравагінальні контрацептиви	
Прогестеронове вагінальне кільце (Progesterone vaginal ring)*	прогестероно-релізінгове вагінальне кільце, що містить 2,074 г мікронізованого прогестерону
4. Естрогени	
5. Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету	
Гліклазид (Gliclazide)	тверда пероральна лікарська форма: 30 мг; 60 мг; 80 мг таблетки з контрольованим вивільненням: 30 мг; 60 мг; 80 мг
Глібенкламід (Glibenclamide)* (може бути використаний як альтернатива гліклазиду)	тверда пероральна лікарська форма: 5 мг
Глюкагон (Glucagon)	ін'єкції: 1 мг/мл
Інсулін для ін'єкцій (розчинний) (Insulin injection (soluble))	ін'єкції: 40 МО/мл по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 5 мл; по 10 мл у флаконі
Інсулін середньої тривалості дії (Intermediate- acting insulin)	ін'єкції: 40 МО/мл по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 5 мл; по 10 мл у флаконі (у вигляді суспензії інсуліну цинку або ізофан інсуліну)
Метформін (Metformin)	таблетки: 500 мг - 1000 мг (гідрохлорид)
6. Овуляційні індуктори	
Додатковий перелік	
Кломіфен (Clomifene)	таблетки: 50 мг (цитрат)
7. Прогестагени	
Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	таблетки: 5 мг суспензія для ін'єкцій: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі або заповненому шприці

8. Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби	
Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки: 25 мкг [д]; 50 мкг; 100 мкг (натрієва сіль)
Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 60 мг; 250 мг
Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)	таблетки: 50 мг
<i>Додатковий перелік [сн]</i>	
Луголя розчин (Lugol's solution)	розчин для перорального застосування: близько 130 мг всього йоду/мл
XIX. Імунобіологічні лікарські засоби	
1. Діагностичні речовини	
Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції
2. Сироватки та імуноглобуліни	
Протиотрутний імуноглобулін (Anti-venom immunoglobulin)*	ін'єкції
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria antitoxin)	ін'єкції: 10000 МО; 20000 МО у флаконі суспензія для ін'єкцій: по 0,5 мл (1 доза) або 1 мл (2 дози) в ампулах (0,5 мл містить: анатоксин дифтерійний очищений концентрований - 5 флокулюючих одиниць (Lf)
3. Вакцини	
Рекомендовано як у вигляді моновакцин, так і комбінованих вакцин	
Вакцина БЦЖ (BCG vaccine) Вакцина проти дифтерії (Diphtheria vaccine) Гемофільна вакцина типу В (Haemophilus influenzae type b vaccine) Вакцина проти гепатиту В (Hepatitis B vaccine) Вакцина проти кору (Measles vaccine) Вакцина проти кашлюку (Pertussis vaccine) Вакцина проти поліомієліту (Poliomyelitis vaccine) Вакцина проти краснухи (Rubella vaccine) Вакцина проти правця (Tetanus vaccine)	
Рекомендації щодо деяких груп високого ризику	
Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)	
Рекомендації за програмами імунізації з певними характеристиками	
Вакцина проти паротиту (Mumps vaccine)	
XX. Міорелаксанти (периферійної дії) та інгібітори холіноестерази	
Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції: 10 мг/мл (безилат)
Неостигмін (Neostigmine)	ін'єкції: 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах; 2,5 мг (метилсульфат) по 1 мл в ампулах таблетки: 15 мг (бромід)
Суксаметоній (Suxamethonium)	ін'єкції: 50 мг (хлорид) / мл по 2 мл в ампулах; 20

	мг/мл по 5 мл в ампулах (суксаметонію йодид) порошок для приготування розчину для ін'єкцій (хлорид) у флаконі
Векуроніум (Vecuronium) [д]	порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Піридостигмін (Pyridostigmine)</i>	<i>ін'єкції: 1 мг/мл по 1 мл в ампулах таблетки: 60 мг (бромід)</i>
XXI. Офтальмологічні лікарські засоби	
1. Протиінфекційні лікарські засоби	
Ацикловір (Aciclovir)	мазь: 3 %
Азитроміцин (Azithromycin)	розчин (очні краплі): 1,5 %
Гентаміцин (Gentamicin)	розчин (очні краплі): 0,3 % (сульфат)
Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі): 0,3 %
Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь: 1 % (гідрохлорид)
2. Протизапальні лікарські засоби	
Преднізолон (Prednisolone)	розчин (очні краплі): 0,5 % (фосфат натрію)
3. Місцеві анестетики	
Тетракаїн (Tetracaine) ☒	розчин (очні краплі): 0,5 % (гідрохлорид)
4. Міотичні лікарські засоби та лікарські засоби проти глаукоми	
Ацетазоламід (Acetazolamide)	таблетки: 250 мг
Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі): латанопрост 50 мкг/мл
Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі): 2 %; 4 %; 1 % (гідрохлорид чи нітрат)
Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі): 0,25 %; 0,5 % (у вигляді малеата водню)
5. Мідріатики	
Атропін (Atropine) ☒	розчин (очні краплі): 0,1 %; 0,5 %; 1 % (сульфат) [д]
Гоматропін (гідробромід) (Homatropine hydrobromide) (може бути використаний як альтернатива атропіну)	
Циклопентолат (гідрохлорид) (Cyclopentolate) (може бути використаний як альтернатива атропіну)	розчин (очні краплі): 1 % (гідрохлорид)
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Адреналін (Epinephrine (Adrenaline))</i>	<i>розчин (очні краплі): 2 % (у вигляді гідрохлориду)</i>
XXII. Лікарські засоби, що впливають на міометрій	
1. Лікарські засоби, що підсилюють скоротливу активність міометрію	

Ергометрин (Ergometrine)	ін'єкції: 200 мкг (гідроген малеату) по 1 мл в ампулах; 0,2 мг/мл по 1 мл в ампулах (1 мл розчину містить метилергометрину малеату 0,2 мг)
Мізопростол (Misoprostol)	таблетки: 200 мкг вагінальні таблетки: 25 мкг*
Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції: 5 МО/1 мл; 10 МО/1 мл
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Міфепрістон (Mifepristone)* - Мізонпростол (Misoprostol)*</i>	<i>таблетки: 200 мг - 200 мкг міфепрістон таблетки: 10 мг, 50 мг, 200 мг мізонпростол таблетки: 200 мкг</i>
2. Лікарські засоби, що зменшують скоротливу активність міометрію (токолітики)	
Ніфедипін (Nifedipine)	швидкокорозчинні капсули: 10 мг
XXIII. Перитонеальний діалізний розчин	
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (intraperitoneal dialysis solution)</i>	<i>парентеральний розчин</i>
XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів	
1. Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах	
Хлорпромазин (Chlorpromazine) [д]	ін'єкції: 25 мг (гідрохлорид) / мл по 2 мл в ампулах розчин для перорального застосування: 25 мг (гідрохлорид)/5 мл таблетки: 10 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг (гідрохлорид)
Флуфеназин (Fluphenazine)	ін'єкції: 25 мг (деканат або енантат) по 1 мл в ампулах
Галоперидол (Haloperidol) [д]	ін'єкції: 5 мг по 1 мл в ампулах таблетки: 1,5 мг; 2 мг; 5 мг
Рисперидон (Risperidone)	тверда пероральна лікарська форма: 0,25 мг - 6 мг
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Клозапін (Clozapine)</i>	<i>тверда пероральна лікарська форма: 25 - 200 мг</i>
<i>Галоперидол (Haloperidol) [д]</i>	<i>розчин для перорального застосування: 2 мг/мл</i>
2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою	
Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах	
Амітриптилін (Amitriptyline)	таблетки: 25 мг; 75 мг (гідрохлорид)
Флуоксетин (Fluoxetine) ☒	тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду)
Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах	
Карбамазепін (Carbamazepine)	таблетки (з поділкою): 100 мг; 200 мг
Літію карбонат (Lithium carbonate)	тверда пероральна лікарська форма: 300 мг

Вальпроева кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	таблетки (з покриттям): 200 мг - 500 мг (вальпроат натрію)
3. Лікарські засоби для лікування тривожних розладів	
Діазепам (Diazepam)	таблетки (з поділкою): 2 мг; 5 мг
4. Лікарські засоби, що застосовуються при обсесивно-компульсивних розладах	
Кломіпрамін (Clomipramine)	тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 25 мг (гідрохлорид)
5. Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин	
<i>Додатковий перелік</i>	
Метадон (Methadone)	концентрат для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид) розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл (гідрохлорид) або 1 мг/мл таблетки: 5 мг; 10 мг; 25 мг; 40 мг
Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки (сублінгвальні): 2 мг; 4 мг; 8 мг
XXV. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання	
1. Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби	
Беклометазон (Beclometasone)	інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг (дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон)
Будесонід (Budesonide) [д]	інгаляція (аерозоль): 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу
Епінефрин (Адреналін) (Epinephrine /Adrenaline)	ін'єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл
Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)	інгаляція (аерозоль): 20 мкг на дозу
Сальбутамол (Salbutamol)	інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг як сульфат (1 доза) розчин для ін'єкцій: 50 мкг (як сульфат) / мл по 5 мл в ампулах; 500 мкг (як сульфат) / мл по 1 мл в ампулах дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (як сульфат) на 1 дозу респіраторний розчин для використання в розпилювачах-небулайзерах: 5 мг (як сульфат)/мл; 1 мг/мл
XXVI. Розчини, що коригують водний, електролітний та кислотно-лужний баланс	
1. Лікарські засоби для перорального застосування	
Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts) Див. розділ XVII	
Калію хлорид (Potassium chloride)	порошок для розчину

2. Лікарські засоби для парентерального застосування	
Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій: 5 % (ізотонічний) розчин для ін'єкцій: 10 %; 40 %; 50 % (гіпертонічний)
Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин: 11,2 % по 20 мл в ампулах (еквівалентно K^+ 1,5 ммоль/мл, Cl^- 1,5 ммоль/мл) розчин для розведення: 7,5 % (еквівалентно K^+ 1 ммоль/мл та Cl^- 1 ммоль/мл) [д]; 15 % (еквівалентно K^+ 2 ммоль/мл та Cl^- 2 ммоль/мл) [д]
Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій: 0,9 % ізотонічний (еквівалентно Na^+ 154 ммоль/л, Cl^- 154 ммоль/л)
Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції: 1,4 % - 8,4 %
Лактат натрію (Sodium lactate), комбінації	розчин для ін'єкцій
3. Інші	
Вода для ін'єкцій (Water for injection)	розчин для ін'єкцій: 2 мл; 5 мл; 10 мл в ампулах
XXVII. Вітаміни і мінерали	
Додатковий перелік	
Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах
XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа [д]	
Оцтова кислота (Acetic acid)	місцево: 2 % в спирті
Будесонід (Budesonide)	назальний спрей: 100 мкг на дозу; 50 мкг на дозу
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево: 0,3 % краплі (гідрохлорид)
Ксилометазолін (Xylometazoline) ☒	назальний спрей: 0,05 % краплі назальні: 0,05 %; 0,1 % по 10 мл
XXIX. Спеціальні лікарські засоби для догляду за новонародженими	
1. Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]	
Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	ін'єкції: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл) розчин для перорального застосування: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл)
Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин або гель: 7,1 % (диглюконат), забезпечуючи 4 % хлоргексидину (для догляду за пупковою раною) [д]
Додатковий перелік	
Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин для ін'єкцій: 5 мг/мл
Простагландин E (Prostaglandin E)	розчин для ін'єкцій: простагландин E1 - 0,5 мг/мл в спирті простагландин E2 - 1 мг/мл
Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл - 80 мг/мл

2. Лікарські засоби, що застосовуються матері новонароджених	
Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції: 4 мг/мл дексаметазону фосфату (у вигляді динатрієвої солі)
XXX. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів	
1. Лікарські засоби для лікування подагри	
Алопуринол (Allopurinol)	таблетки: 100 мг
2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)	
Хлорохін (Chloroquine)	таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату); 250 мг (фосфат)
Додатковий перелік	
Азатиоприн (Azathioprine)	таблетки: 50 мг
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) [cn]	тверді пероральні дозовані форми: 200 мг (у вигляді сульфату)
Метотрексат (Methotrexate)	таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі)
Пеніциламін (Penicillamine)	тверді пероральні дозовані форми: 250 мг
Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки: 500 мг

Примітка. У цьому переліку застосовуються такі позначки:

"(•)" позначає аналогічний клінічний ефект в межах фармакологічного класу. У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки у переліку зазначено лікарський засіб, який доступний за найнижчою ціною з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби;

"☒" означає, що є обмеження за віком або масою тіла для використання лікарського засобу;

"[сп]" означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців для використання у дітей;

"[д]" означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження використання для дітей;

"(*)" та "(**)" означають, що особливості застосування лікарського засобу встановлюються МОЗ."

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

<http://yurist-online.org/>

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 480).
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1499 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2073).